CURIOSITY MISSION À HAUT RISQUE

planet
astronomy.
com

Par Jean-Pierre MARTIN
jpm@planetastronomy.com

Update février 2013

* Site de nouvelles sur l'Astronomie et l'Espace :
<http://www.planetastronomy.com>

PLAN DE LA PRÉSENTATION

- * 1) Quelques données sur Mars
- * 2) Les premières missions martiennes
- * 3) Que sait-on de Mars
- * 4) La mission Curiosity
- * 5) Le lancement
- * 6) L'atterrissage
- * 7) Le Rover
- * 8) Les instruments
- * 9) Le site d'atterrissage
- * 10) Le succès!!!
- * 11) Le début de la mission

La plupart des photos non marquées sont de la NASA/JPL ou de l'ESA pour Mars Express

1-L'HISTOIRE DE LA PLANÈTE MARS

- ★ Mars fut repérée très tôt dans le ciel par nos glorieux ancêtres, les Romains baptisèrent cette planète du nom de leur Dieu de la Guerre
- ★ Son mouvement dans le ciel intriguait car il était rétrograde par moment
- ★ Seul Copernic comprit pourquoi, en commettant un sacrilège : la Terre n'était plus au centre du système solaire

OÙ EST MARS?

- ★ Située après la Terre et donc un peu plus loin du Soleil que nous, elle est à la limite de la « zone habitable »

MARS = $\frac{1}{2}$ TERRE

- * Mars est née en même temps que la Terre il y a approximativement 4.5 Milliards d'années
- * Mars est 2 fois plus petite que la Terre et en gros **10 fois moins lourde** (densité plus faible)
- * Ceci aura des conséquences sur son évolution :
- * La gravité y est plus faible que sur Terre (1/3) et en conséquence **son atmosphère s'échappe** au cours du temps (Vitesse de libération + faible)
- * Le CO2 diminuant, l'effet de serre (qui a sauvé la race humaine!!!) s'inverse, **la température diminue**
- * Les dés sont jetés, Mars sera une planète froide, c'est une Terre avortée

- ★ Plus éloignée aussi du Soleil, elle se refroidit plus vite, **le noyau se solidifie** donc
- ★ **Pas de champ magnétique**
- ★ Donc pas de protection contre les particules dangereuses provenant du Soleil, et donc difficulté pour une certaine forme de vie de s'établir
- ★ Le volcanisme est très actif : 20 volcans majeurs, les derniers ayant été actifs récemment (qq dizaines de millions d'années!)
- ★ Pas de tectonique de plaques mais des failles et fractures (Valles Marineris)
- ★ L'eau dans le passé a été un agent d'érosion, maintenant le vent joue un rôle essentiel

LE CLIMAT MARTIEN

- ★ L'orbite de Mars est excentrique (elliptique) ($e=0,09$), cela induit des variations climatiques importantes entre périhélie et aphélie (**saisons comme sur Terre**)
- ★ 40% de chaleur en plus au périhélie
- ★ Température moyenne = -55 °C
- ★ Min en hiver = -130 °C
- ★ Max en été = $+27\text{ °C}$
- ★ **Mars est un DÉSEERT GLACÉ**

* Mars, un désert glacé

Photos NASA

L'ATMOSPHERE DE MARS

- * 95.6% CO_2
- * 2.7% N_2
- * 1.6% Ar
- * 0.1% O_2
- * 0.03% H_2O
- * **Pression moyenne** 6 mbar (1 - 9 mbar) soit **<1% de la nôtre**
- * Venteux : jusqu'à 120km/h, tempêtes qui peuvent durer plusieurs mois → Érosion

L'EAU ?

- ★ L'eau ne peut pas exister longtemps à l'état liquide en surface sur Mars actuellement pourquoi?
- ★ **Température trop basse** (de 0 à -100°C) et **pression trop faible** (<1% de la pression terrestre)
→ sublimation : **solide** → **gazeux directement**
- ★ En fait l'eau liquide serait dans un état métastable, c'est à dire qu'elle pourrait rester liquide en surface pendant qq heures avant de se sublimer, c'est le grand espoir des sondes martiennes, ou alors, elle contiendrait des sels.
- ★ Par contre de l'eau existe certainement en sous-sol

* Diagramme de phase de l'eau

POURQUOI L'EAU EST-ELLE SI IMPORTANTE?

- ★ Elle diffuse facilement à travers les membranes des cellules, c'est un **solvant parfait**
- ★ Forte chaleur spécifique : peut stocker de grandes quantités de chaleur sur une planète, **amortit les variations climatiques**
- ★ **GLACE MOINS DENSE QUE L'EAU** : elle flotte sur l'eau ce qui est FONDAMENTAL: protège les organismes sous la glace des basses températures
- ★ Existe sous ses 3 formes sur Terre : cycle de l'eau
- ★ Pour le futur : contient H et O : futures sources d'énergie?

CARACTÉRISTIQUES ORBITALES

- * 1,5 UA Une année martienne = 687 jours
- * 6900 km diamètre (la moitié de la Terre), $d=3,9$
- * Très excentrique $e = 0.09$, cela a aidé Kepler a formuler sa première loi (ellipse)
- * Inclinaison axe rotation $\sim$ Terre $\rightarrow$ Saisons
- * **Un jour martien s'appelle : un sol $\sim$ un jour terrestre**
- * Deux satellites miniatures, dont l'un (Phobos) sous la limite de Roche

2-LES PREMIÈRES MISSIONS MARTIENNES

- ★ Nos amis Russes n'ont jamais eu de chance avec Mars, toutes leurs missions ont échoué ou presque
- ★ Toutes les missions à succès ont été US, mais ils ont eu aussi de cuisants échecs (50%)
- ★ Cela a commencé avec l'épopée des Mariner dans les années 1960
- ★ Puis vinrent les Viking avec la recherche de la vie
- ★ Pathfinder, un démonstrateur prototype, ouvre ensuite la marche pour les
- ★ Robots Spirit et Opportunity et Phoenix
- ★ Une pléiade de satellites tournent aussi autour de Mars : MGS, Mars Express, Mars Odyssey, MRO etc..

MARS IS HARD!

EARTH

15

HALF-TIME
SCORE:

MARS

24

Mars Exploration Family Portrait

40: Mars Science Laboratory Curiosity
November 26, 2011
Mission to Gale Crater

39: Phobos-Grunt
November 8, 2011
Stranded in Earth orbit

1, 2: MARS TM No. 1 / MARS TM No. 2
October 10 / October 14, 1960
Both destroyed during launch

38: Phoenix
August 4, 2007
Landed, dug for water

3, 4, 5, 8: MARS 2MV-4 No. 1 / Mars 1 / Mars 2MV-3 No. 1 / Zond 2
October 24 / November 1 / November 4, 1962 / November 30, 1964
Broke up in Earth orbit / Radio failure en route / Stranded in Earth orbit / Radio failure en route

37: Mars Reconnaissance Orbiter
August 12, 2005
Orbiting Mars

6, 7: Mariner 3 / Mariner 4
November 5 / November 28, 1964
Payload fairing failed to open / First flyby and picture return

35, 36: Mars Exploration Rovers Spirit and Opportunity
June 10 / July 7, 2003
Both landed on surface, Opportunity still in operation

9, 10: Mariner 6 / Mariner 7
February 25 / March 27, 1969
Both flew by, returned pictures

34: Mars Express / Beagle 2 lander
June 2, 2003
Orbiting Mars, Beagle lost after separation

11, 12: Mars 1969 A / Mars 1969 B
March 27 / April 2, 1969
Both destroyed during launch

33: Mars Odyssey
March 7, 2001
Orbiting Mars

13, 17: Mariner 8 / Mariner 9
May 8 / May 30, 1971
Destroyed during launch / First probe to orbit Mars

32: Mars Polar Lander
January 3, 1999
Crashed on surface

14, 15, 16: Cosmos 419 / Mars 2 / Mars 3
May 10 / May 19 / May 28, 1971
Failed in Earth orbit / Lander crashed / Lander failed

31: Mars Climate Orbiter
December 11, 1998
Crashed due to imperial/metric unit mixup

18, 19, 20, 21: Mars 4 / Mars 5 / Mars 6 / Mars 7
July 21 / July 25 / August 5 / August 9, 1973
Missed planet / Orbiting planet / Lander failed (6 and 7)

30: Nozomi
July 4, 1998
Missed planet

22, 23: Viking 1 / Viking 2
August 20 / September 9, 1975
Both landed on surface, returned data

29: Mars Pathfinder
December 4, 1996
Landed on surface, deployed Sojourner rover

24, 25: Phobos 1 / Phobos 2
July 7 / July 12, 1988
Lost communication en route / Lost communication near Phobos

28: Mars 96
November 16, 1996
Destroyed during launch

26: Mars Observer
September 25, 1992
Lost communication near Mars

27: Mars Global Surveyor
November 7, 1996
Orbiting and returned data

Image credits: NASA, Roscosmos, ESA, JAXA, Tezuka (lander)
Additional research sources: space.com, houstonjournal.com
Data not included are the landers: Only anticipated Mars missions are listed.
Created by Jason A. Davis
www.astronomy.com

LES ANNÉES MARINER

**LA CLEF DE TOUS CES SUCCÈS :
LA NASA AU TRAVERS DU JPL :
JET PROPULSION LABORATORY**

PHOTO : NASA/JPL

**On pensait que Mars était comme la lune, un
astre mort; On était passé à côté de l'essentiel**

Les prochaines sondes vont nous éclairer

**À cette époque, aucun vaisseau spatial n'a le
plus changé notre vision d'une planète que
Mariner 9 en 1971 (il faudra attendre MGS
pour faire encore mieux), on découvrait ce que
les autres Mariners n'avaient pas dévoilé**

VIKING ET LA RECHERCHE DE LA VIE

- * Viking procède en 1976 à trois expériences qui doivent rechercher une éventuelle vie martienne
- * Mais les conditions imposées font que les réponses sont négatives ou au moins ambiguës
- * À suivre

LA RÉVOLUTION C'EST PATHFINDER!

- ★ Pathfinder / Sojourner
- ★ Un robot de 16kg explore le site pendant 3 mois
- ★ **C'est lui le véritable précurseur** : air bag; robot; etc....
- ★ C'est un démonstrateur technologique qui a fonctionné à 200%!

LA VRAIE COULEUR DES NUAGES DE MARS

PHOTO : NASA/JPL

3-QUE SAIT-ON DE MARS ?

- * Les sondes martiennes ont complètement changé la vision simpliste que nous avions au début des années 1960

UNE NOUVELLE VISION DE MARS

- ★ Depuis plusieurs décennies des sondes automatiques explorent Mars et nous en donnent une vue bien meilleure
- ★ La planète a été entièrement cartographiée
- ★ Des robots se sont posés à sa surface et ont analysé son sol
- ★ Nos connaissances progressent

- ★ Cartographie complète et précise de Mars en altitude et température
- ★ **Le plus grand canyon du système solaire**, Valles Marineris, près de 4000km de long (les USA!) 2500m de profondeur en moyenne 10000m par endroits
- ★ **Le plus haut volcan du système solaire** : Olympus Mons; 25km de haut, la moitié de la France en surface.
- ★ Calcule masse d'eau des pôles = Groenland
- ★ **Deux hémisphères différents**, le Nord avec de grands bassins (mer dans le passé?) et le Sud très cratérisé.
- ★ Les vents jouent un grand rôle
- ★ Résurgences liquides probables, des traces d'anciennes « rivières » sont apparentes
- ★ La surface de Mars est riche en Fer II y a approximativement 15 à 20% de Fer à la surface de Mars Ce fer s'est oxydé avec le temps et l'oxygène de l'atmosphère, **la planète est devenue....rouge**
- ★ Mars a été comme toutes les planètes soumise à un bombardement météoritique incessant surtout au début de son histoire
- ★ Beaucoup de questions en suspens

Hémisphère
Nord en
moyenne
5km plus
bas que
le Sud

ALTITUDE:
25KM

500KM

**LE PLUS GRAND VOLCAN DU SYSTEME SOLAIRE
OLYMPUS MONS 25KM**

* Olympus Mons vu par Mars Express (Photo ESA/HRSC)

LA LAVE EST TRÈS PRÉSENTE

COULÉE DE LAVE AU SUD DE THARSIS (DIAM CRATÈRE 2KM)

31

PLANÈTE ROUGE

NASA/JPL/VIKING

★ À cause de la présence de « rouille » (Fer oxydé avec le peu d'Oxygène de l'atmosphère)

GLISSEMENT DE TERRAIN SUR MARS

★ Ici Kasei Valles

© MSSS

600 m

MARS A DU CŒUR !

R04-00395

E11-00090

R06-01364

E04-01788

Y-A-T'IL EU DE L'EAU SUR MARS ?

- ★ Des traces d'anciennes « rivières » sont apparentes

Nirgal Vallis Mars Malin Space MSSS

MARS

**TERRE : YÉMEN UN ANCIEN
LIT DE RIVIÈRE**

MSSS

★ Et ici,
Kasei
Vallis

★ Vallée
de
débâcle

◀

★ Nandedi
Vallis,
cette photo
couvre une
largeur de
10km

★ L'eau a
creusé un
sillon de
plusieurs
km de large

◀

ON VOIT
BIEN LE LIT
DU
« FLEUVE »

UN DELTA DÉCOUVERT

- ★ La NASA rend public ces documents pris par MGS
- ★ Évidence que de l'eau a séjourné pendant de très longues périodes sur Mars

DES COUCHES SÉDIMENTAIRES COMME DANS LE GRAND CANYON

Photo :
MGS/MSSS

© M MALIN

IL Y A EU BEAUCOUP D'EAU SUR MARS DANS LE PASSÉ

- * On le voit bien sur les photos précédentes
- * Les débits étaient probablement très importants
- * Quels effets climatiques ont causé ces inondations?
- * Une chaleur interne?; un changement de l'axe de Mars? il y a qq millions d'années l'inclinaison était de 35°; les météorites ...
- * Y aurait-il des cycles chaud/froid sur Mars?
- * **OÙ EST PASSÉ L'EAU???**

GRANDE DÉCOUVERTE !

* Une découverte récente du Caltech : le Pôle Sud de Mars contient plein d'eau (avant on pensait que c'était principalement du CO₂) sur 1km d'épaisseur

* **Les pôles N et S contiennent donc principalement de la glace d'eau** recouverte d'une mince couche de glace carbonique

- ★ Les Pôles N et S seraient identiques en composition, le N aurait 1m de glace carbonique (fond en été) et le S un peu plus, 8m qui ne fondrait pas totalement
- ★ C'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois :
- ★ Bonne : pour une expédition humaine, on n'a plus besoin d'emmener une réserve immense d'eau
- ★ Mauvaise : il semble qu'il n'y ait pas assez de CO₂ sur Mars pour déclencher un effet de serre, afin de rendre Mars plus chaude (voir Terraforming). Mars serait la seule planète terrestre avec si peu de CO₂ pourquoi??

MAIS IL N'Y A PAS DE L'EAU QU'AUX PÔLES

- ★ Il semble qu'elle se soit écoulee en certains endroits (ravines, « gullies » en anglais) avant de se sublimer

LES RAVINES

DE L'EAU
S'ÉCOULE DES
PENTES DU
CRATÈRE

LES RAVINES

DE MÊME SUR
CETTE PHOTO ,
DE L'EAU
S'ÉCOULE DES
PENTES DU
CRATÈRE

LES ARGILES

- ★ Les argiles découvertes par MEX sont plutôt sur les plateaux
- ★ Ils prouvent l'existence passée d'eau pendant de longues périodes.

- ✦ un beau spectacle de vallée de débâcle indiquant clairement qu'un liquide a coulé à cet endroit.
- ✦ C'est la vallée Reull Vallis qui a été creusée il y a longtemps par un flot d'eau et de glace. Elle s'étend sur 1500km dans les hautes terres de l'hémisphère Sud,

MARS : HISTOIRE D'EAU !!!

- ★ On peut donc en ce début de XXI^{ème} siècle faire le point sur la présence d'eau sur Mars :
- ★ 1) Présence en sub-surface d'énorme quantité d'eau solide incorporée dans le sol dans les régions près des pôles (permafrost)
- ★ 2) Contrairement à ce que l'on pensait depuis plus de 30 ans , les Pôles sont principalement de la glace d'eau et non de CO₂
- ★ 3) Il y a en certains endroits sur les parois les plus froides de cratères des résurgences RÉCENTES d'eau
- ★ De nouvelles missions doivent confirmer encore tout cela

LA VIE ?

- ★ Sur Terre la vie est apparue il y a 4 milliards d'années. On trouve la vie même dans les milieux les plus hostiles

Mount St.
Helens

Thermal
Springs

Too Hot
to
Handle

Underwater
Vent

Living Organisms

Desolate
Deserts

Y a-t-il de la vie
au fond de
certains trous que
l'on trouve ça et
là??

LA VIE SUR MARS ?

- ★ Pas impossible, mais.....
- ★ Il y a quelques problèmes ou handicaps:
 - La vie nécessite des molécules complexes (**chimie organique**) qu'il va falloir trouver
 - La vie nécessite de **l'eau liquide** : possible qu'il y en ait en certains endroits , à vérifier
 - La vie peut être **détruite par les UV**, or l'atmosphère martienne n'a pas assez d'ozone pour les bloquer
 - Le **champ magnétique martien est aussi trop faible** pour protéger contre les particules solaires comme sur Terre
- ★ Alors.....

SOMMES NOUS DES MARTIENS ???

- ★ La vie sur Terre est apparue presque au tout début : vers 4 Milliards d'années
- ★ Probablement, un phénomène similaire s'est produit sur notre sœur Mars
- ★ Mars étant plus petite et plus loin du Soleil que la Terre, s'est refroidie plus vite
- ★ **La vie aurait pu apparaître sur Mars avant d'apparaître sur Terre**
- ★ A-t-on étéensemencé par des météorites martiennes?
- ★ **Si oui, les Martiens, c'est NOUS!!**

★ Continuons l'exploration

Ce que voient les rovers

Ce que l'on aimerait voir

Des myrtilles toujours des myrtilles (hématites)

EN ROUTE POUR VICTORIA

Opportunity Traverse Map (Sol 766)

Opportunity Victoria Crater sol 1133
©NASA/JPL www.planetastronomy.com
colorized & stitched by JPM

★ Le trajet d'Opportunity depuis 2004.

- * Mais une des photos les plus émouvantes de MRO est celle de notre environnement: **la Terre et la Lune.**
- * Voici ce système double vu depuis l'orbite de Mars
- * Elle a été prise le 3 Octobre 2007 par la caméra HiRISE, à cette époque Mars était éloigné de 142 millions de km de nous.

* **Phobos** une vingtaine de km de "diamètre" est condamné, il est en dessous de la limite de Roche et s'écrasera un jour sur Mars; sa surface possède une caractéristique : **un grand cratère de 10km de diamètre**, le cratère Styckney, dû à un choc avec un astéroïde certainement.

* Photo prise avec filtres couleurs qui mettent au jour une zone bleue due au "splash" de l'impact, dont on ne connaît pas l'origine.

LE VENT EST UN AGENT D'ÉROSION IMPORTANT

- ★ Les tempêtes de sable peuvent durer des mois
- ★ MGS a découvert aussi l'existence de tornades locales de poussières (dust devils) qui laissent des traces noires sur le sol

NASA/MSSS

LES DUNES MARTIENNES

- ★ La caméra HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) a surpris une de ces tornades de poussières martiennes (les fameux dust devils en anglais) en train de se déplacer sur le sol de la planète rouge.
- ★ Cette tornade blanche fait quelques 30m de diamètre et s'élève jusqu'à 800m d'altitude

● Phoenix

Viking 2 ●

Viking 1 ●

● Mars Pathfinder

● Opportunity

Spirit ●

4-LA MISSION CURIOSITY

- ★ La mission MSL (Mars Science Laboratory) avec son rover Curiosity, est la mission la plus importante (et probablement la plus chère : 2,5 Milliards de \$) du XXI ème siècle.
- ★ **900kg dont 90kg de charge utile** (les expériences) avec une masse au départ de près de 4 t.
- ★ Arrivée rapide sur Mars (Mach 2), ce qui occasionnera des températures de 2000°C sur le bouclier thermique
- ★ Mais la grande nouveauté avec Curiosity, c'est **son mode d'atterrissage très différent** des autres missions :
- ★ L'atterrissage est assez intéressant, car le support de MSL possède une « grue ascenseur » (**sky crane**) qui le dépose au sol lorsqu'il est à quelques mètres d'altitude.

LES OBJECTIFS DE LA MISSION

- ★ · **Déterminer si la vie a pu exister sur Mars.** Les dernières missions ont montré que l'eau liquide a existé sur Mars peu après la formation de la planète. Qu'en est-il maintenant ?
- ★ La mission est conçue pour étudier **les cycles du carbone (chimie organique?)** et de l'eau sur la planète au cours du temps. Les instruments de MSL tenteront de déterminer sous quelle forme et en quelle quantité le carbone et l'eau sont stockés sur la planète et dans l'atmosphère.
- ★ · **Étudier le climat** de Mars présent et passé (paléoclimat) et la composition de l'atmosphère.
- ★ · **Étude de la géologie** martienne. Recherche de la preuve de la formation de roches en présence d'eau liquide.
- ★ · **Préparer une éventuelle exploration humaine.**

4,5m de diamètre

- * 1 - Étage de croisière (600kg)
- * 2 - Bouclier arrière (350kg)
- * 3 - Étage de descente (1300kg)
- * 4 - Rover (900kg)
- * 5 - Bouclier thermique (380kg)
- * 6 - Logement du parachute

★ À noter : en 3 et 10 : lests largués avant l'entrée, en 4 : moteurs d'orientation

Comparaison avec les rovers précédents

5-LANCEMENT MSL

- ★ Lancement de MSL le 26 Novembre 2011 par une Atlas V
- ★ Durée du voyage : 7 mois et demi

6-L'ATTERRISSAGE

7 MINUTES DE TERREUR!

- ★ La phase d'entrée commence quand la sonde atteint l'atmosphère martienne vers les 130km d'altitude, elle se terminera avec l'atterrissage.
- ★ Mais la grande nouveauté avec Curiosity, c'est son mode d'atterrissage très différent des autres missions:
- ★ Cette entrée dans l'atmosphère ne se fait pas au hasard, elle est guidée afin d'obtenir **une extrême précision à l'atterrissage** (ellipse de 20km autour du point choisi, alors que les MER : 150 par 20km)
- ★ Cela est possible grâce à des petites fusées situées sur le bouclier arrière
- ★ Après une phase de ralentissement classique avec parachute et rétrofusées, la suite devient plus intéressante, **car le support de MSL possède un "ascenseur" (sky crane)** qui le dépose au sol lorsqu'il est à quelques mètres d'altitude.
- ★ Lorsqu'il est bien sur le sol, la partie sky crane est ensuite propulsée plus loin et ne sert plus, elle va s'écraser à plusieurs km de distance.
- ★ **Le rover est immédiatement opérationnel.**
- ★ Voyons cela en détails maintenant.

POURQUOI UNE ENTRÉE SI PRÉCISE?

- ★ En effet cette mission se différencie des précédentes par la précision nécessaire pour l'atterrissage 20km au lieu de 150.
Pourquoi? Pour deux raisons :
- ★ L'endroit où l'on veut se poser est chaotique, **il faut être sûr de se poser sur du plat et de l'amener au pied d'une montagne** que l'on veut absolument explorer.
- ★ Afin de se poser dans des endroits « bas » de la planète et de bien viser.

* **Comment viser le bon point sur Mars :**

- * L'étage de croisière est équipé de fusées pour guider la sonde grâce à des corrections de trajectoire, la dernière ayant lieu 2 heures avant l'atterrissage.
- * L'étage de croisière se sépare ensuite.
- * Ensuite, ce qui se passe est tout nouveau pour une mission spatiale : l'entrée n'est plus balistique comme les missions précédentes (cône d'entrée dirigé dans la direction du mouvement, rotation autour de l'axe de symétrie, trajectoire contrôlée par l'atmosphère) mais **l'entrée est contrôlée** et sa position stabilisée sur 3 axes. La sonde effectue une rotation pour que sa pointe soit dirigée vers la cible.
- * 5 minutes avant l'entrée dans l'atmosphère, des lests (75kg) en Tungstène sont éjectés d'un côté de la capsule afin de modifier son centre de gravité, le nez va piquer alors de 20° vers le bas, inclinaison que l'on va conserver pendant toute l'entrée atmosphérique. (entrée = 130km d'altitude approx de la cible, qui est un point relativement bas de Mars)
- * **L'entrée est rapide : 6km/s! 2000°C** Cela va nécessiter un revêtement différent des autres missions pour le bouclier thermique (PICA). Le bouclier absorbe 90% de l'énergie cinétique.

EDL : Entry, Descent and Landing

- ★ La sonde ne tombe plus, elle « vole » maintenant dans l'atmosphère de Mars, sa trajectoire est analysée par des gyroscopes à bord, qui vont jouer sur son angle de rentrée afin d'être sur la bonne coordonnée pour ouvrir le parachute avec la bonne vitesse.
- ★ La sonde ralentit, elle atteint Mach 2, quand elle atteint la bonne altitude (approx 11.000m) pour déployer le parachute, elle éjecte 6 masses de 25kg de l'autre côté de la précédente éjection de lest, afin de la rééquilibrer
- ★ Le parachute peut maintenant se déployer.
- ★ On entre dans la phase EDL : Entry, Descent and Landing qui peut être divisée en 2 parties :

DESCENTE EN PARACHUTE

- ★ La descente en parachute : elle dure de l'ordre d'une minute, mais le parachute (énorme : 16m de diamètre, si gros **qu'il se verra facilement sur les photos de MRO!**) doit absorber pendant ce court laps de temps 95% de l'énergie cinétique de la sonde.
- ★ Le bouclier thermique est éjecté grâce aux boulons explosifs, les capteurs de distance (TDS terminal descent sensors) sont maintenant en fonctionnement.
- ★ La caméra de vision du sol (MARDI Mars descent imager) est activée. Elle donnera plus tard des informations sur le site d'atterrissage.
- ★ Vers les 2000m ou 1500m , la sonde a ralenti à 100m/s; on est prêt pour la phase suivante.

* Le plus grand parachute jamais utilisé pour une mission spatiale! (16m de diamètre!)

- ★ Des boulons explosifs vont libérer les deux boucliers de protection
- ★ Nos amis Américains étant friands de symboles , c'est **76 boulons explosifs** qui seront installés au total sur la sonde (rappelant la révolution de 1776!)
- ★ 17 minutes avant l'atterrissage, les 10 premiers boulons seront allumés à 5 ms d'intervalle, libérant l'étage de croisière avec son véhicule de descente.
- ★ 125ms plus tard deux boulons liés à des ressorts éjectent le bouclier

◀ * Le plus grand de tous les boucliers thermiques (2000°C) : 4,5m de diamètre

★ Répartition de la chaleur pendant l'entrée sur les différentes tuiles isolantes (PICA)

- * La caméra MARDI (Mars Descent Imager) nous permet de voir l'atterrissage!
- * Elle est fixée sous le châssis du rover.

DESCENTE CONTRÔLÉE

- ★ La descente contrôlée (Powered Descent) ; les 8 rétro fusées sont prêtes à être activées
- ★ Les boulons explosifs séparent le bouclier arrière et le parachute du reste de la sonde, la sonde accélère pendant un court instant, on ne peut pas allumer les rétro tout de suite de peur de « cogner » le bouclier arrière!
- ★ Les rétro fusées s'allument enfin après une seconde.
- ★ Arrivée vers 400m la descente ralentit à un taux de 20m/s, cela va prendre approx 30secondes.
- ★ Arrivé vers les 50m d'altitude, les rétro fusées sont allumées plus fortement afin de réduire la vitesse à un petit **0,75m/s**
- ★ Nous sommes arrivés vers les 20m d'altitude, il faut arrêter de freiner sinon on ne se pose pas! On coupe 4 des 8 fusées.
- ★ On est prêt pour la phase critique de l'atterrissage : la grue ascenseur (Sky Crane)

LE SKY CRANE

- ★ Le Sky Crane : **Mais pourquoi un tel système?**
- ★ Curiosity est énorme (5 fois la masse d'Opportunity) : 900kg, ce qui rend un impact classique (comme pour les MER) difficile à garantir sans problème, d'autre part des fusées de guidage comme pour les Vikings entacherait sa capacité à se déplacer sur le sol martien avec la place que cela prendrait.
- ★ Nos amis du JPL devaient trouver une autre solution : le Sky Crane qui doit assurer un atterrissage en douceur du rover.
- ★ De plus le fait d'avoir des rétro fusées qui ne polluent pas trop le sol près de l'atterrissage est aussi un plus pour les expériences.

UNE MANŒUVRE À HAUT RISQUE

- ★ La manœuvre s'effectue en 5 étapes :
- ★ Couper les rétro fusées
- ★ Déployer les roues du rover
- ★ Déposer le rover doucement sur la surface, le contact est détecté par la grue (moins d'effort)
- ★ Couper les connexions électriques et mécaniques (3 câbles de Nylon très solides qui seront coupés par des boulons pyrométriques) entre le rover et la grue
- ★ Éjecter la grue le plus loin possible (150m?) grâce à ses rétro fusées.
- ★ Et alors, et alors..Curiosity est arrivée!!!
- ★ Comment le saura-t-on? **3 sondes martiennes (Mars Odyssey; MRO et Mars Express) vont écouter Curiosity** et transmettre les OK des différentes séquences à la Terre.
- ★ Distance parcourue : 567 Mkm **14 min. de décalage avec la Terre.**

Cruise Stage Separation

Time: Entry + 10 min

Cruise Balance Devices Separation

Time: Entry + 8 min

Entry Interface

Altitude: ~78 miles (~125 km)
Velocity: ~13,200 mph (~5,950 meters/sec)
Time: Entry + 0 sec

Peak Heating

Peak Deceleration

Heat Shield Separation

Altitude: ~5 miles (~8 km)
Velocity: ~200 mph
(~125 meters/sec)
Time: Entry + ~278 sec

Hypersonic Aero-manuevering

Parachute Deploy

Altitude: ~7 miles (~11 km)
Velocity: ~900 mph
(~405 meters/sec)
Time: Entry + ~254 sec

Radar Data Collection

Back Shell Separation

Altitude: ~1 mile (~1.6 km)
Velocity: ~180 mph
(~80 meters/sec)
Time: Entry + ~364 sec

Powered Descent

Sky Crane

Figure 1

Sky Crane Detail

Reverse Sky Crane Init

Altitude: ~66 feet (~20 meters)
Velocity: ~1.7 mph (~0.75 meter/sec)
Time: Entry + ~400 sec

Midway Descent

Terminal Descent

Altitude: 0
Velocity: ~1.7 mph
(~0.75 meter/sec)
Time: Entry + ~418 sec

Figure 1

Landing accuracy capabilities & concepts

Unguided (MER, Phoenix, Exomars):
50 km radius

Ballistic guided entry phase (MSL):
10 km radius

Ballistic guided entry phase and optimised
parachute opening (enhanced MSL):
3 km radius

Pinpoint landing (< 3 km) would require
ground observation during descent and
lateral guided powered terminal phase

MSL 2009 System
Triggers chute deployment on speed

Improved accuracy, triggers chute
Deployment on position

LA PHASE ULTIME

- * Il y a différentes animations concernant cette mission :
- * Animation globale
- * Animation de l'atterrissage (5 min)
- * Animation Rover

UNE COOPÉRATION INTERNATIONALE POUR « VOIR » L'ATERRISSAGE

- ★ Les sondes MRO et Mars Odyssey américaines changent d'orbite pour aider à la transmission lors de l'atterrissage et essayer de capturer ce moment.?
- ★ De même la sonde européenne Mars Express sera présente en back up
- ★ Toutes transmissions : UHF 400 MHz

7-LE ROVER CURIOSITY

- ★ **C'est un 6x6** comme le dit malicieusement Francis Rocard! Il devrait être capable de parcourir jusqu'à 300m par jour!
- ★ Le rover devrait pouvoir passer des **obstacles de 75cm** de haut.
- ★ La propulsion du rover Curiosity est nucléaire, assurée par des GPHS-RTG, grâce à un **générateur thermoélectrique à radio-isotope** (RTG) de nouvelle génération (le MMRTG)
- ★ Utilisation de 4,8 kg de dioxyde de plutonium (PuO_2) enrichi en plutonium 238
- ★ Puissance initiale de 2 000 W thermiques convertis en **200W électriques** par des thermocouples (PbTe/TAGS) (effet Seebeck)
Énergie de 2,5 kWh/j (au lieu des 0,6 à 0,9 kWh/j sur les MER)
Dans 14 ans, 100W électriques attendus Autonomie totale jour/nuit et hiver/été
- ★ Des radiateurs de 50 m de tubes rejèteront la chaleur excédentaire grâce à un fluide caloporteur

- * La taille comparée des roues
- * Les roues de Curiosity font 50cm de diamètre

Comparaison des caractéristiques de Curiosity avec celles des MER et de Sojourner

Caractéristiques \ ROVER	Curiosity (2011)	MER (Mars Exploration Rover) (2003)	Sojourner (1996)
Masse (lancement/entrée/rover)	3400 / 2600 / 900 kg	1077 / 841 / 179 kg	895 / 620 / 10,6 kg
Puissance-Energie par sol (croisière/surface)	1000 W-solaire / 2500 WHrs-RTG	600 W-solaire / 900 WHrs-solaire	
Hauteur du mât/base des roues	2,1 m / 1,9 m	1,5 m / 1,4 m	0,3 m
Garde au sol/Diamètre roue	0,66 m / 0,5 m	0,3 m / 0,26 m	0,2 m / 0,13 m
Site d'atterrissage	Cratère Gale	Cratère Gusev (Spirit) Meridiani Planum (Opportunity)	Ares Vallis
Taille de l'ellipse	20 km x 20 km	150 km x 20 km	200 km x 100 km
Altitude max	2 km	1,3 km	< 1,5 km du niveau moyen de l'échelle
Latitude	+60° à -60°	+10° à -15°	
Masse Charge Utile Scientifique	85 kg	6 kg	0,6 kg
Capacité de déplacement (distance max)	20 km	600 m (7,7 km pour Spirit et plus de 30 km pour Opportunity)	101,8 m

8-LES INSTRUMENTS

E MSL-09

Les instruments

Instruments sur le mât

CHEMCAM : Spectroscopie issue d'un tir laser et imagerie (LANL et CNES/CNES)
MASTCAM : Caméras multispectrales et stéréos

Instruments au contact (bras)

MAHLI : Microscope (roches, sol, glace et glace)
APXS : Spectromètre Proton/ X-ray backscatter

Laboratoire d'analyse (chassis de devant)

SGN : Analyse JETON (Neutrons, électrons et positrons) (SSPC)
Cinq instruments scientifiques :
- Spectromètre de masse JEDI (JEDI) (SSPC)
- Chromatographe en phase gazeuse (France)
CHEMIN : Analyse minéralogique par diffraction et fluorescence X

Instruments pour l'environnement

DAN : Détecteur de neutrons pour mesurer l'H₂
NEMIS : Capteurs météorologique (vent, T°, P et UV)
MARDI : Imageur HR et couleur pour la descente
RAD : Spectromètre de mesure des radiations de surface

- ★ Curiosity emporte 10 expériences scientifiques
- ★ Pour détecter des traces d'eau
- ★ Pour analyser les roches et minéraux (argiles, sulfates, carbonates...)
- ★ Pour imager à haute résolution l'environnement
- ★ La France participe activement à de nombreux instruments.

"Curiosity" Mars Science Laboratory

With a length of 9 feet (2.7 m) and weight of 1,984 pounds (900 kg), the nuclear-powered rover "Curiosity" will carry a payload of scientific experiments more than ten times as massive as earlier Mars rovers.

ChemCam will fire a laser and analyze the elemental composition of vaporized materials from areas smaller than 1 millimeter on the surface of Martian rocks and soils.

MMRTG Nuclear Power Source contains 10 pounds (4.5 kilograms) of plutonium dioxide.

Robotic Arm puts instruments in contact with the Martian soil. Instruments include the **Alpha Particle X-ray Spectrometer (APXS)** and the **Mars Hand Lens Imager (MHLI)**, as well as devices associated with sample acquisition and preparation.

Six wheels, each with its own individual motor. The two front and two rear wheels also have individual steering rotors, which allow the vehicle to turn in place a full 360 degrees.

SOURCE: JET PROPULSION LABORATORY

Graphic by Karl Tittel

INSTRUMENTS

Mesure et Observation à Distance (mât) :

- CHEMCAM : Analyse par spectrométrie de la lumière d'un plasma issu d'un tir laser (jusqu'à 10 m de distance) sur des roches martiennes
- MASTCAM : Ensemble de caméras pour réaliser des images multispectrales et stéréos à des distances variant de quelques centimètres à plusieurs kilomètres et des vidéos haute définition (10 images/s)

Instruments de contact (bras) :

- APXS : Déterminera les abondances élémentaires des roches et du sol
- MAHLI : Microscope pour réaliser des images des roches, du sol, du givre et de la glace

Laboratoire d'analyse (avant du châssis) :

- CHEMIN : Analyse minéralogique d'échantillons de roches par diffraction et fluorescence des rayons X
- SAM : Suite instrumentaire qui réalisera des analyses minérales et atmosphériques, détectera des composés organiques et réalisera des analyses d'isotopes stables d'organiques et de gaz nobles.

Caractérisation de l'environnement (montée sur le corps ou le mât) :

- DAN : Détecteur de neutrons pour mesurer l'hydrogène (incluant l'eau)
- MARDI : Caméra pour réaliser lors de la descente et de l'atterrissage sur Mars des images hautes résolution et en couleur pour étude du contexte géologique du site
- RAD : Caractérisera un large spectre de radiation en vue de l'exploration humaine de Mars
- REMS : Package météorologique pour la mesure du vent, de la pression et de la température avec en plus un capteur Ultraviolet

MSL - STRATÉGIE ANALYTIQUE POUR L'EXPLORATION MARTIENNE

- * MASTCAM (Mast Camera) est un ensemble de deux caméras fixées au sommet du mat du rover MSL à une hauteur de 2m au-dessus du sol qui fournit des images en couleurs, en lumière visible et en proche IR.
- * Une grand angle 34mm et une télé 100mm
- * Développée par la célèbre firme Malin Space (MGS, MRO).

TOUTES LES CAMÉRAS

COMPARAISON DES DIFFÉRENTS CHAMPS DE VISION

Comparison of MSL Camera Fields of View and Resolutions

LE CHEMCAM

- * **Le ChemCam** (Chemistry Camera); c'est un instrument d'analyse élémentaire des roches et des sols autour du Rover et jusqu'à environ 9 mètres.
- * Il utilise la technique d'analyse spectroscopique induite par évaporation laser.
- * Il est situé dans le mât et bombarde (jusqu'à 9m) avec un faisceau Laser sa cible et analyse la vapeur émise.
- * Développé par le CEA, le CNES et un laboratoire de Los Alamos.

Chem Cam

CHEMCAM-MU Deputy-PI : Sylvestre Maurice (CESR)

PRINCIPALES FONCTIONS DE CHEMCAM

- ❖ Viser un échantillon (distance entre 2 et 10 m)
- ❖ Former une image de l'échantillon
- ❖ Envoyer un faisceau Laser pulsé vers l'échantillon ($1.5W/cm^2$)
- ❖ Collecter la lumière pour analyse spectrale (entre 250 et 800 nm)

CHEMCAM-Mast Unit

Engineering Model
Livré au LANL le 18 juin 07.

• Masse : 8 Kg
• Puissance : 5,3 W

- ★ On produit un plasma en focalisant un faisceau Laser sur le corps à analyser. La lumière réémise donne la composition.
- ★ Contrairement à la mesure par Rayonnement X, la technique Laser (LIBS en anglais laser-induced breakdown spectroscopy) est sensible aux **éléments légers** de faible n° atomique tels que : H, Li, Be, B, C, N, O. Donc les composés organiques sont mesurés facilement.
- ★ Chemcam comporte 6144 canaux d'analyse couvrant le spectre de 240 à 850nm.
- ★ Le **rayon d'analyse est aussi très fin**, ce qui est utile pour l'étude de strates sédimentaires.
- ★ Il va donner des informations sur les roches et les sols autour du rover.

Rover-Mounted
Calibration Targets

MAST UNIT

BODY UNIT

MAST-To-BODY
OPTICAL FIBER
(JPL)

*Chemcam

* Les yeux de Chemcam!

Photo : LANL

SAM : Sample Analysis at Mars

- ★ Le SAM dont le co-PI est Michel Cabane (LATMOS), c'est un chromatographe en phase gazeuse (GCMS)
- ★ La mission de SAM ? **Recenser les composés organiques présents dans les échantillons de sol et d'atmosphère** prélevés sur place. (un peu comme les Vikings)
- ★ Spectre du basalte vu par SAM.

SAM-GC Co-PI : Michel Cabane (SA)

PRINCIPALES FONCTIONS DU GC

- ❖ Séparer des composés d'un échantillon de gaz à l'aide de colonnes chromatographiques (tubes capillaires métalliques de longueur 10 à 30 m et de diamètre 0,3 à 0,5 mm)
- ❖ Détecter les composés gazeux à l'aide d'un TCD (Détecteur à Conductivité Thermique)
- ❖ Envoyer les composés gazeux à un spectromètre de masse

SAM
Masse : 30 Kg
Dim. : 55/42/31 cm

Atmospheric Inlets

Quadrupole Mass Spectrometer (QMS)

Solid Sample Inlet Tubes (SSIT)

Electronics

Tunable Laser Spectrometer (TLS)

Wide Range Pump (WRP)

Gas Chromatograph (GC)

Sample Manipulation System (SMS)

Chemical Separation & Processing Laboratory

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?

- ★ On prélève un échantillon du sol que l'on pulvérise
- ★ Il est ensuite conduit vers un des 74 réceptacles puis transféré dans le four (1000°C)
- ★ On sépare les composants dans le chromatographe (analyse de la composition)
- ★ Les différentes molécules sont identifiées.
- ★ Un autre instrument (spectromètre Laser) prend la suite pour certaines molécules comme l'eau et le CO₂
- ★ Les résultats sont envoyés sur Terre
- ★ Voir vidéo

★ Les buts de SAM

Science and Measurement Goal	Habitability Question
1) Survey carbon compound sources and evaluate their possible mechanisms of formation and destruction 2) Search for organic compounds of biotic and prebiotic importance, including methane.	What does the inventory or lack of carbon compounds near the surface of Mars tell us about its potential habitability?
3) Reveal the chemical and isotopic state of elements (i.e. N, H, O, S and others) that are important for life as we know it. 4) Determine atmospheric composition including trace species that are evidence of interactions between the atmosphere and soil.	What are the chemical and isotopic states of the lighter elements in the solids and in the atmosphere of Mars and what do they tell us about its potential habitability?
5) Better constrain models of atmospheric and climatic evolution through measurements of noble gas and light element isotopes.	Were past habitability conditions different from today's?

LE RAD

- ★ C'est le Radiation Assessment Detector, détecteur de tous les types de particules (p, e-, He+, n ...) qui atteignent le sol martien.
- ★ Essentiel pour mesurer **l'influence biologique** (des organismes peuvent ils survivre dans le sol?) et pour préparer une éventuelle présence humaine.
- ★ En apprendre sur les particules en provenance du Soleil
- ★ Allemand/Américain

LE DAN

- ★ Acronyme de Dynamic of Albedo Neutrons, détecteur de neutrons dans le sol jusqu'à 1m de profondeur.
- ★ C'est en fait **un détecteur de H dans le sol**, donc d'une possibilité de présence d'eau (glace), l'Hydrogène (en fait l'eau et les composants hydratés) absorbant fortement les neutrons.
- ★ Fourni pas nos amis Russes.

L'EAU DE SUB-SURFACE

- ★ Est mesurée par le détecteur à neutrons DAN : Dynamic Albedo of Neutrons
- ★ Fourni par les Russes, il devrait être capable de **détecter de l'eau (de la glace) jusqu'à 50cm sous la surface.**
- ★ Mesure l'énergie des neutrons émis, H les ralentit.

★ Mars Odyssey avait déjà établi une carte des neutrons de Mars

Les instruments au bout du bras

★ Sur le bras télémanipulateur se trouve entre autre, une caméra pour voir de près, incluant prise de vue en couleur et vidéo

★ MAHLI : Mars Hand Lens Imager

★ Développée par Malin Space

★ Plaque de calibration pour la Mahli

9-UN CHOIX ENTRE 4 CIBLES

- ★ Il y eut **133 sites proposés**, qui se sont réduits progressivement à 10 sites prioritaires, puis à 4 (indiqués sur la slide ci-dessus) et finalement
- ★ The winner is.....

La cible : le cratère GALE

Gale Crater: Clays & Sulfates

- Fe-rich smectite (nontronite) w/ Al^{3+}
- Mg-sulfates (monoh and polyhydrated)
- mafic signatures in rocks & aeolian material
- lower ~1 km dominated by sulfates
- crystalline hematite...from sulfate strata?
- origin of clay/sulfate unknown
- fluvial system being exhumed
- strata in Upper formation apparently lack evidence of hydrous minerals

Mawth Vallis: Clays & Sulfates(?)

- Al-rich clay minerals
- Fe-rich smectite (nontronite)
- Hydrous phases...sulfates?
- Al-clays mixed with sulfates?
- origin of clay/sulfate unknown
- most strata planar & exhibit parallel bedding
- In crater S of ellipse, great examples of non-planar bedding, faults/folds, vertical accretion, brecciation, etc.

Holden Crater: Clay Minerals

- Mg/Fe mixed-layer chlorite/smectite, similar to what is seen throughout ULM
- possible non-mixed-layer Mg/Fe-smectite in Uzboi, but not yet observed in Holden
- olivine & pyroxene signatures in crater wall
- clays accessible to MSL are largely consistent with a detrital origin
- association of clays & mafics in crater wall suggest some of those clays may be authigenic

Eberswalde Crater: Clay Minerals

- Mg/Fe mixed-layer chlorite/smectite in delta
- Fe-bearing smectite (nontronite?); from altered olivine in Holden ejecta?
- pyroxene signatures in delta, surrounding terrains
- clay minerals in the ellipse and along any potential traverse path
- clays may be a mix of detrital and authigenic

Eberswalde Crater (24°S , 327°E , -1.5 km) contains a clay-bearing delta formed when an ancient river deposited sediment, possibly into a lake.

Gale Crater (4.5°S , 137°E , -4.5 km) contains a 5-km sequence of layers that vary from clay-rich materials near the bottom to sulfates at higher elevation.

Holden Crater (26°S , 325°E , -1.9 km) has alluvial fans, flood deposits, possible lake beds, and clay-rich sediment.

Mawrth Vallis (24°N , 341°E , -2.2 km) exposes layers within Mars' surface with differing mineralogy, including at least two kinds of clays.

Eberswalde Crater: MOLA

Eberswalde -23.8953°S 326.7426°E -1435 m

Gale Crater: MOLA

Gale -4.4868°S 137.4239°E -4449 m

Mawrth Vallis Site 2: MOLA

Mawrth 23.9883°N 341.0399°E -2231 m

Holden Crater: MOLA

Holden -26.4007°S 325.1615°E -2088 m

25 km x 20 km Ellipses Oriented ~E-W for 2011 Launch

E. Noe, Y. Sun

Mars Science Lab's two year journey through Martian geology

Previous landings

- ★ Cratère Gale
- ★ 155 km de diamètre Alt = 1500 m Prof = 3000m
3,8 à 3,5 Mds années (fin Noachien)
- ★ **Pic central : plus de 5 km** au-dessus du fond du cratère. Altitude max = 700 m au-dessus du 0
- ★ Curiosity devrait escalader une partie de ce pic!
- ★ **Couches sédimentaires**; actions probables de l'eau
- ★ Sa position sur Mars, à l'opposé d'Opportunity, permettrait à la NASA de pouvoir opérer ces deux rovers facilement dans le temps.

Gale's Key Topographic Attributes

Mound is 5 km High

- Valleys and Canyons
- Dark-toned Dunes
- Dark-toned Layered Yardangs
- Upper Mound
- High Thermal Inertia Fan
- Low Thermal Inertia Fan
- Lobate Features
- Mound Skirting Unit (or similar texture)
- Sinuous Ridges

Ellipse Science: Alluvial Fan

- Fan sediment, inverted channels
 - Infer depositional process and duration
- Fan stratigraphy
 - Erosional and depositional history
- Samples of Gale crater wall (noachian crust)
 - Composition and alteration history

Pic central

Dépôts récents

Failles colmatées

Sulfates

Argiles

Cratères récents

Parcours prévu de Curiosity

Roches stratifiées

Delta

Vallees

Bord du cratère

CRISM Mineral Story (Milliken et al. 2010)

CRISM mineral parameter maps on CTX mosaic

iron (nontronite)
clay (nontronite)
sulfate/clay mix
sulfates

White arrow =
stratigraphic
range of basic
traverse

5
Kilometers

(a)

(b)

(c)

(d)

© Jean-Pi -4500 m

1500 m

172

172

Ellipse corrigée

★ Une grande variété de sols

VU PAR MARS EXPRESS

© ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum)

10-LE SUCCÈS

- ★ Et le 6 Août 2012 à 7H32 du matin heure de Paris, le JPL nous informe que
- ★ **Touchdown confirmed. We're safe on Mars !**
- ★ L'atterrissage s'est bien passé, on est sur Mars
- ★ Applaudissements

MAIS AVANT D'EN ARRIVER LÀ, QUE S'EST IL PASSÉ ?

- * Les 7 minutes de terreur de la descente comme le disait les Américains, sont devenues les 7 minutes de bonheur.
- * Les différentes étapes étaient suivies religieusement :
- * Le bouclier thermique s'oriente correctement, on est à 130km d'altitude, la vitesse : approx 20.000km/h, MSL est le premier engin à effectuer une entrée « guidée » dans l'atmosphère martienne et non plus balistique
- * À cet effet des masselottes (balance mass) de Tungstène sont éjectées, afin que le centre de gravité soit correct, des fusées s'allument pour corriger la trajectoire
- * Le bouclier thermique une minute après l'entrée est à son maximum : 2000°C
- * 4 minutes après l'entrée atmosphérique, 6 masselottes d'une vingtaine de kg chacune sont éjectées afin de corriger encore le centre de gravité de la sonde et de permettre de ralentir
- * Quelques instants plus tard, à 10.000m le parachute géant s'ouvre. On est à Mach 2.
- * 24 secondes plus tard : Le bouclier thermique et le capot arrière sont séparés, on est vers les 7000m
 - * · Le radar a détecté le sol
 - * · Le rover et sa grue se détachent du parachute et les 8 rétrofusées se mettent en marche
 - * · On est à 1000m et on descend à 70m/s, puis 40m à 10m/s
 - * · Le sky crane (la grue) descend Curiosity sur la surface à la vitesse de 2km/h
 - Touch down ! Contact des roues OK Les câbles de la grue sont coupés, celle-ci est propulsée plus loin.

- * Quelques instants après les premières images basse résolution (thumbnails) arrivent, elles proviennent des hazcams situées très près du sol, ce sont des fisheye, d'où l'aspect ; encore des applaudissements.

- ★ Puis la première haute résolution
- ★ Prise par la Hazcam arrière gauche
- ★ On y voit le sol martien sous la sonde

Impact of
sky crane
(1 second after
touchdown)

Curiosity Hazcam Aug 6 , 2012

- * La première image couleur :
- * Prise par la MAHLI
- * Au loin le bord Nord du cratère Gale
- * De la poussière reste probablement sur la caméra

- * Prise par la caméra MARDI du rover lors de la descente
- * On voit le bouclier thermique éjecté de la sonde
- * Prise 3 secondes après son éjection 2 minutes et demi avant touch down
- * La MARDI a pris plusieurs centaines d'images qui forment une vidéo

- * Prise aussi par la MARDI avant l'atterrissage, on y voit le souffle presque circulaire d'une des rétrofusées sur le sol
- * Curiosity est à 20m du sol

TOUTES LES CAMÉRAS

- * Image extraordinaire vue par MRO
- * Quand on pense que le direct n'est pas possible à cause du décalage horaire et qu'il a fallu estimer correctement la trajectoire d'entrée de Curiosity pour pouvoir photographier son parachute
- * MRO était à 340km de Curiosity et lui même à 3000m de la surface.
- * Bravo les Américains!

Gale Crater

MSL

MRO

OÙ A ATTERRI CURIOSITY?

Curiosity Best Estimate Landing Location
-4.59° Latitude, 137.44° Longitude

05-Aug-2012

COMPARAISON DES ELLIPSES

* Vu par MRO

Sky crane

Curiosity

Back shell

Parachute

1500 m

Heat Shield

★ Exemple de sols
sédimentaires

Ancient Streams

Ancient
Dunes

Ancient Groundwater

1 meter

* Première image de la Navcam, une fois le mât redressé.

* Prise par la MARDI après l'atterrissage

★ Tout va bien à bord!

Antenne de
communication
grand gain

Marqueur indiquant
le mouvement d'un
moteur ou d'une
articulation

MOSAIC:
NASA/JPL/CALTECH/KEN KREMER/MARCO DI LORENZO

PRESSURE SENSOR

★ Les premières mesures météo

GROUND AND AIR TEMPERATURE SENSOR

★ Premier panorama en couleur

Photo : MRO/HiRise

Landing Site Glenelg

Base of Mount Sharp

Lower Reaches of Mount Sharp

MIND EQU

Kilometers

0 0.5 1 2 3 4 5

★ À l'assaut!

◀

* Première vue complète du Mont Sharp.

▶

Merci à Emily Lakdawalla de la Planetary Society

Investigation
Square is 8 mm

Laser spot

★ Le premier tir Laser

ChemCam image
Circle is 6 cm

La cible

LA FRANCE SUIT EN DIRECT L'ATTERRISSAGE

Curiosity Landing - Paris France (Poissy) Area
August 6 2012 7:00 am

★ Applaudissements :
Curiosity has landed!!

longue pour vous!

À LA CITÉ DES SCIENCES AUSSI

LE DÉBUT DE LA MISSION

- ★ Le bras armé de la Curiosité!
- ★ Go Go gadget-au-bras!

DE NOUVEAUX INDICES DE LA PRÉSENCE PASSÉE D'EAU.

- ★ Curiosity continue son chemin vers le Mont Sharp.
- ★ Il étudie son environnement et découvre des paysages familiers aux Terriens, c'est normal, il se trouve dans le lit d'un ancien fleuve.
- ★ Cette zone est située au pied du Mont Sharp dans le cratère Gale, on peut voir une photo prise d'orbite de la région, où cette plaine alluviale est représentée, l'eau provenant de Peace Vallis.

- * Photo : à gauche Mars, à droite la Terre. On y remarque sur Mars, un empilement de petits graviers de quelques cm, caractéristique de la sédimentation formée par la déposition d'eau sur le sol.
- * Ces graviers ont une forme adoucie due à l'abrasion provoquée par le flux d'eau qui s'écoule lorsque ces galets s'entrechoquent entre eux.
- * Ces graviers sont trop grands pour être transportés par le vent, c'est bien une action fluviale qui en est la cause.
- * **C'est la première fois que l'on identifie in situ des graviers transportés par l'eau sur Mars.**

AUTO PORTRAIT

CURIOSITY & MOUNT SHARP - SOL 85

Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS/Ken Kremer/Marco Di Lorenzo

- * Autoportrait de Curiosity sur le site Rocknest avec vue complète du Mont Sharp à l'horizon.
 - * Image assemblée à partir des « brutes » du 1^{er} Nov 2012
- Crédit : *NASA/JPL-Caltech/MSSS/Ken Kremer/Marco Di Lorenzo*

- * On voit les différentes couches bien découpées un peu comme des plaques de gypse ou d'ardoise qui se détachent.
- * La zone couverte par cette image : 90 cm.
- * La Chemcam a été utilisée à cet endroit ainsi que l'analyseur SAM.

◆ Rover Way Points — Traverse Path ◻ Descent Blast Zone

Au 21 fev 2013

Image Credit:
NASA/JPL-Caltech/University of Arizona
Background HiRISE Image:
ESP_028335_1755_RGB

PRÉPAREZ LA FOREUSE

- ★ Après avoir essayé pour la première fois la balayette (en fait cela s'appelle le DRT : Dust Removable Tool) sur une partie plate du sol martien dans la zone appelée « Yellowknife Bay », les techniciens étaient satisfaits du bon fonctionnement.
- ★ Le rover analysera d'abord le sol de surface avant de procéder au forage et à l'analyse de la carotte qui en résultera.

Contact Sensor / Stabilizer

Top View of Curiosity's Drill

Section View of Curiosity's Drill Bit

La zone est pleine de craquelures et de sillons en forme de veines ; elle comporte aussi beaucoup de petites sphérules minérales. On pense que l'eau devait couler à cet endroit autrefois.

CURIOSITY IN YELLOWKNIFE BAY

SOL 157

CREDIT: NASA/JPL-CALTECH/KEN KREMER/MARCO DI LORENZO

Snake River

John
Klein
outcrop

A high-resolution photograph of the Curiosity rover's robotic arm on the Martian surface. The arm is extended, and the spectrometer instrument is positioned just above the soil. The ground is reddish-brown and textured with small rocks and pebbles. The rover's shadow is cast to the left. In the top right corner, there is a blue navigation button with a white left-pointing arrow.

* Le spectro est en position de mesure avant de mettre la foreuse en action

**CURIOSITY AT JOHN KLEIN OUTCROP
SOL 168**

CREDIT: NASA/JPL/MSSS/KEN KREMER/MARCO DI LORENZO

- ✦ Le 8 Février 2013, premier forage
- ✦ Un trou de 16mm de diamètre et de 64mm de profondeur
- ✦ La poudre va être analysée par Chemin et SAM

★ Le premier
prélèvement va
est dirigé vers
Chemin et
SAM après
passage dans
le tamis de
Chimra.

- ★ Après le passage au tamis de 150 micron, Chimra fractionne la poudre en deux parties et le bras articulé les dépose dans les orifices des laboratoires CheMin et Sam.
- ★ CheMin, est spécialisé dans la chimie et la minéralogie
- ★ Il contient 74 récipients, permettant chacun une analyse: l'une en diffraction X, qui renseigne sur sa structure cristalline, et l'autre en fluorescence X, pour déterminer ses éléments chimiques.
- ★ Sam (Sample Analysis at Mars), contient plusieurs instruments : chromatographe en phase gazeuse et spectromètre de masse.

- ★ La sonde Curiosity a analysé l'échantillon provenant du premier carottage dans ce sol sédimentaire du cratère Gale, qui correspond très vraisemblablement à un ancien lit de rivière.
- ★ Il est passé dans CheMin (Chemistry and Mineralogy) et dans SAM (Sample Analysis at Mars).
- ★ On a identifié les éléments suivants : **C, H, N, O, P et S**. ce sont les composants principaux de la vie.
- ★ Les CHNOPS, acronyme des différents éléments chimiques qu'ils représentent, sont ceux nécessaires à la vie. Ils ont tous été découverts !
- ★ Cet échantillon est composé d'argile (à 20%) et de sulfates (de Calcium), correspondant à un **environnement humide peu oxydé (la carotte était grise et non pas rouge) et pas trop salé ni acide, et probablement légèrement alcalin.**

* Résultats de l'analyse (chauffage haute température 835°C et passage au spectro de masse) par SAM de l'échantillon, montrant la présence d'eau de CO₂, d'Oxygène, de SO₂ et de H₂S.

* Ensuite les gaz émis sont envoyés vers le spectromètre Laser (le TLS) pour mesurer les isotopes de C, O et H. on s'attache particulièrement au rapport D/H qui est un marqueur de la quantité d'eau dans le passé.

* La troisième étape est d'envoyer ces gaz dans un chromatographe en phase gazeuse (QMS) qui recherche principalement les matériaux organiques.

Major gases released from the bedrock called "John Klein" and analyzed by the SAM instruments

- ✳ Comparaison de la diffraction X de deux échantillons martiens analyses par l'instrument CheMin.
- ✳ À gauche : poussière de surface de l'endroit baptisé Rocknest.
- ✳ À droite : poussière provenant de la carotte prise à John Klein.
- ✳ On remarque sur l'image de droite la signature de phyllosilicates (argiles) qui indique un environnement liquide.
- ✳ De plus la présence de sulfate de Calcium, plutôt que de sulfate de Mg ou de Fe, indique un environnement neutre ou légèrement basique. **Tout ceci étant compatible avec un lit d'ancienne rivière.**

- * COMME LE DIT UN SCIENTIFIQUE DE LA MISSION :
- * ON AURAIT PU BOIRE CETTE EAU!

- ★ L'environnement autour du forage vu par la Mastcam avec différents filtres (12).
- ★ La réflectivité des différents points en fonction des longueurs d'onde
- ★ Extrême droite : les données en labo sur Terre

Curiosity sol 183
Mastcam RGB Natural Color
Two drill holes and their gray tailings

Combining Mastcam left and right
science filter data to study details of
the visible to infrared spectrum

Laboratory spectra of example
iron-bearing minerals

Lab spectra from USGS (R. Clark) ASU (J. Bell)

Knorr

- ★ Une autre image intéressante d'une roche (baptisée Knorr) prise par la Mastcam mais dans le proche IR et qui indique en fonction des couleurs le degré d'hydratation des minéraux.
- ★ **Plus c'est rouge plus c'est hydraté.**
- ★ On remarque que les signaux les plus forts correspondent aux veines de couleur pale et à certains petits nodules incrustés dans la pierre.
- ★ Cette image date du 20 Dec 2012.
- ★ La largeur de la photo sur le terrain : 25cm.

Mastcam Filter Data from Knorr

★ Bonne exploration Curiosity et à bientôt pour de nouvelles découvertes.

- ★ Encore un mystère
- ★ En roulant dessus le rover a cassé cette roche (de 12cm de large)
- ★ L'intérieur est de couleur bleue
- ★ Pourquoi?

MARS VOUS OFFRE SON CŒUR ET VOUS REMERCIE

DÉPRESSION
PRÈS DU POLE
SUD
Promethei Rupes
region near
79.6°S,
298.3°W

UN PROJET FOU : LE TERRAFORMING

- ★ Le but : changer l'atmosphère de Mars afin de la rendre propice à une certaine forme de vie
- ★ Cela pose quand même un problème d'éthique en a-t'on le droit?
- ★ Mars pourrait dans le futur devenir une colonie de la Terre en cas de surpopulation
- ★ Est-ce utopique?
- ★ Que faudrait-il théoriquement pour y arriver?

David.Lauterbach@scifi.com

David.Lauterbach@scifi.com

Que faut-il
pour en
arriver là?

David.Lauterbach@scifi.com

a) FAIRE FONDRE LES PÔLES

- ★ Afin que cela produise de l'eau liquide
- ★ Comment : soit à l'aide de miroirs géants placés en orbite, soit en changeant l'orbite d'une comète ou astéroïdes afin qu'il s'écrase sur les pôles
- ★ Une fois l'eau coulant sur la planète, cela aura un effet sur l'atmosphère en jouant sur le cycle de l'eau
- ★ L'atmosphère va devenir plus dense

b) DENSIFIER L'ATMOSPHÈRE

- ★ L'eau va s'évaporer et avoir tendance à favoriser un effet de serre
- ★ La température de surface devrait s'élever

c) CRÉER DE L'OXYGÈNE

- ★ Introduire des plantes qui vont initier la photosynthèse , source de toute vie
- ★ Une équation MAGIQUE :
$$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + \text{Sucre}$$
- ★ On pourrait aussi ajouter quelques bactéries pour aider au processus
- ★ L'oxygène va créer comme sur Terre une couche protectrice des UV : l'Ozone

EST-CE UN
RÊVE?

R04-00395

E11-00090

R06-01364

E04-01788